



手机也能上知网

上手机知网, 随时随地  
畅游知识海洋! 请手机  
访问: wap.cnki.net



用手机查阅  
6000部辞典!



节点文献

## ESRD患者营养不良、炎症、动脉粥样硬化相互关系的研究

### The Relationship between Malnutrition, Inflammation and Artherosclerosis in ESRD Patients

[分页下载](#)
[分章下载](#)
[整本下载](#)
[在线阅读](#)
 不支持迅雷等下载工具。

[免费订阅](#)

【作者】许静;


【导师】袁伟杰;

【作者基本信息】第二军医大学, 内科学, 2006, 博士

**【摘要】** 第一~三部分 透析患者营养评价及透析前后蛋白质和氨基酸代谢目的:为系统了解肾病透析患者的营养状况,特别是蛋白质和氨基酸代谢,为临床营养治疗和综合治疗提供参考依据。方法:本研究随机选择慢性肾功能衰竭患者106例,其中83例行血液透析,23例作腹膜透析,通过体格检查和生化检验的方法进行营养状况评价;并对其中26例血透患者用24小时回顾法进行饮食营养调查,用《临床营养质量控制系统》软件系统进行评价。测量了20例血透患者透析前后血清矿物质、蛋白质、氨基酸的含量;结果:20例血透患者每天摄入热能为 $8.49 \pm 1.82 \text{ MJ}$  ( $2031.3 \pm 436.1 \text{ kcal}$ ),蛋白质占总热能14.36%,脂肪37.33%,糖类48.48%。蛋白质组成和比例基本合理,维生素D、B<sub>6</sub>和B<sub>12</sub>摄入较低,而叶酸、生物素、泛酸偏高;钙为 $514.8 \pm 15.9 \text{ mg}$ ,碘 $2809.5 \pm 102.1 \mu\text{g}$ 。摄入食物组成不够合理,有些饮食习惯也不符合合理营养和平衡饮食的要求。106例患者体格检查和血液检查结果提示有近半数患者存在营养不足,三头肌皮褶厚度低于正常值50%;体质指数评价与体重评价相近。血清胆固醇含量正常,三酰甘油酯略高,其中血透患者为 $3.8 \pm 0.6 \text{ mmol/L}$ ,腹透者为 $2.0 \pm 0.3 \text{ mmol/L}$ ;脂蛋白apo-a含量高于正常值。身体测量参数均在正常范围,血透和腹透患者血红蛋白和淋巴细胞均偏低。此外,腹透患者总蛋白、白蛋白也偏低,视黄醇结合蛋白偏高。血清支链氨基酸含量较低,苯丙氨酸、脯氨酸、谷氨酸浓度较高;血钙、钠、钾含量正常,血磷含量高于正常值。20例患者透析前后血清蛋白质和氨基酸均有改变,血清视黄醇结合蛋白、前白蛋白、白蛋白均有所升高,转铁蛋白下降。血清脯氨酸、半胱氨酸、甘氨酸、谷氨酸、苯丙氨酸、赖氨酸、组氨酸、精氨酸透析后含量下降,支链氨基酸透析后含量升高,但透析前后均低于对照组,透析后氨基酸总量较透析前显著下降。结论:研究表明,肾病血液透析患者营养不足现象较为严重,饮食结构和营养素组成比例欠妥,故应加强营养咨询和宣教,使之符合平衡饮食的要求,改善营养状况。血液透析加重蛋白质和氨基酸营养不足。还原

【关键词】肾病患者; 透析疗法; 氨基酸; 蛋白质;

【文内图片】



的脂肪来源和比例可见,脂肪酸的组成不够合理,可以认为是

【网络出版投稿人】第二军医大学 【网络出版年期】2006年 09期

【分类号】R692.5 【下载频次】194 攻读期成果

节点文献中:

[知网节下载](#)

本文链接的文献网络图示:

※本文的引文网络





